



**Dr. F. Codina Garcia**  
prop dels infants

## **Mol·luscos Contagiosos**

És una malaltia benigna. Es caracteritza per la presència de petites berrugues de pocs mil·límetres. Les berrugues poden aparèixer en qualsevol lloc del cos. El mol·luscos contagiosos són una malaltia produïda per una infecció vírica.

El número d'elements es molt variable, des d'unes poques unitats a desenes d'elements. Els nens amb dermatitis atòpica o amb el sistema immunitari deprimat presenten més elements.

Tot i el seu nom, és una malaltia poc contagiosa. Cal un contacte íntim i continuat com pot ser compartir tovalles, esport de contacte... La prevenció del contagi ha de tenir en compte aquests conceptes.

És una malaltia autolimitada. Durant un temps les berrugues s'assequen i cauen, però apareixen noves lesions. Després desapareixen les lesions definitivament. El procés fins a la resolució definitiva pot durar mesos.

Els mol·luscos no solen produir molèsties. De vegades els pacient pateixen picor. Les berrugues no deixen lesions.

Les berrugues es poden treure per curetatge (escapçant les berrugues) o per crioteràpia (congelant les berrugues amb nitrogen).

Els tractament tòpics han ofert resultats negatius, potser el més aconsellable és el Molutrex®. El Molutrex® és un preparat d'hidròxid de potassi que provoca una acció inflamatòria després de l'aplicació tòpica sobre el mol·luscos durant 10-14 dies. Aquesta inflamació de la lesió fa que la berruga s'assequi i caigui. No s'ha d'aplicar en menors de 3 anys ni sobre mucoses o pell ferida.